


# Beitrag zur Kenntniss des Tetraphenylthiophens, seiner Nitro- und Aminoderivate.



Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

genehmigt von der

Hohen Mathematisch-naturwissenschaftlich. Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.



Vorgelegt von

**Emmi Graef**

aus Wuppertal-Barmen

---

Bonn 1937

Anton Brand, Bonn.

Referent: Professor Dr. W. Dilthey.



Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. W. Dilt-  
hey, unter dessen Leitung die vorliegende Arbeit entstand, sage  
ich für seine vielseitigen Anregungen meinen herzlichsten Dank.



# Inhaltsverzeichnis.

## Theoretischer Teil

|                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Tetraphenylthiophen . . . . .                                            | 7     |
| II. Nitrierung von Tetraphenylthiophen . . . . .                            | 9     |
| III. Die Stellung der Nitrogruppe im Mononitrotetraphenylthiophen . . . . . | 11    |
| IV. Die Stellung der Nitrogruppen in den Dinitroderivaten                   | 15    |
| V. Konstitutionsbeweisende Kondensationsversuche . .                        | 17    |
| VI. Aminoderivate des Tetraphenylthiophens . . . .                          | 18    |
| VII. Zusammenfassung . . . . .                                              | 19    |

## Experimenteller Teil

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Darstellung von Tetraphenylthiophen . . . . .                                                                  | 20 |
| II. Nitrierungsprodukte von Tetraphenylthiophen . .                                                               | 20 |
| A) 1. $\alpha$ -4-Nitrotetraphenylthiophen . . . . .                                                              | 20 |
| 2. $\alpha$ -4-Aminotetraphenylthiophen . . . . .                                                                 | 21 |
| 3. $\alpha$ -4-Tetraphenylthiophendiazoniumperchlorat . .                                                         | 22 |
| 4. $\alpha$ -4-Oxytetraphenylthiophen . . . . .                                                                   | 22 |
| 5. $\alpha$ -4-Acetylaminotetraphenylthiophen . . . .                                                             | 23 |
| 6. $\alpha$ -4-Anisalamिनotetraphenylthiophen . . . .                                                             | 23 |
| 7. $\alpha$ -4-Nitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd . . .                                                            | 24 |
| 8. Oxydation von $\alpha$ -4-Acetylaminotetraphenylthiophen . . . . .                                             | 24 |
| 9. Ozonabbau von $\alpha$ -4-Nitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd . . . . .                                          | 25 |
| B) 1. $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen und $\alpha\beta$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen . . . . . | 26 |
| 2. $\alpha\alpha'$ -44'-Diaminotetraphenylthiophen . . . .                                                        | 27 |
| 3. $\alpha\alpha'$ -44'-Diacetyldiaminotetraphenylthiophen . .                                                    | 28 |
| 4. $\alpha\alpha'$ -44'-Dibenzoyldiaminotetraphenylthiophen .                                                     | 28 |
| 5. $\alpha\alpha'$ -44'-Dianisaldiaminotetraphenylthiophen . .                                                    | 29 |
| 6. Kupplungsprodukt von $\beta$ -Naphthol mit $\alpha\alpha'$ -44'-Tetraphenylthiophendiazoniumchlorid . . . .    | 29 |

|                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7. Reduktionsversuche von $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen unter verschiedenen Bedingungen . . . . . | 30    |
| 8. $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd . . . . .                                               | 31    |
| 9. Titration des Alkalifalzes . . . . .                                                                             | 32    |
| 10. Abbauversuche mit verschiedenen Oxydationsmitteln . . . . .                                                     | 33-35 |
| C) 1. $\alpha\beta$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen . . . . .                                                       | 26    |
| 2. $\alpha\beta$ -44'-Diaminotetraphenylthiophen . . . . .                                                          | 36    |
| 3. $\alpha\beta$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd . . . . .                                                 | 36    |
| 4. Abbauversuche unter verschiedenen Oxydationsbedingungen . . . . .                                                | 37    |
| D) 1. Hexanitrotetraphenylthiophen . . . . .                                                                        | 38    |
| III. Nitrierungsprodukte von $\alpha$ -4-Nitrotetraphenylthiophen                                                   |       |
| 1. $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen und $\alpha\beta$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen . . . . .      | 39    |
| IV. Nitrierung von $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen                                                  |       |
| 1. Tetranitrotetraphenylthiophen . . . . .                                                                          | 40    |
| V. Nitrierung von Tetraphenylthiophen-S-dioxyd                                                                      |       |
| 1. $\alpha$ -4-Nitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd . . . . .                                                          | 40    |
| VI. Kondensationsversuche . . . . .                                                                                 | 41-45 |

## THEORETISCHER THEIL.

### I. Tetraphenylthiophen.

Tetraphenylthiophen (Thionessal) wurde wohl zuerst im Jahre 1844 von A. Laurent<sup>1)</sup> beobachtet, als er Benzenulfür (Thiobenzaldehyd) der trockenen Destillation unterwarf. Als Summenformel gibt er  $C_{26}H_{18}S$  an und fand den Schmelzpunkt  $179^{\circ}$ . Nitrierungsversuche ergaben ein gelbes, flockiges Pulver.

1865 wird Thionessal vom Schmelzpunkt  $180^{\circ}$  und der Summenformel  $C_{26}H_{18}S$  von C. Märker<sup>2)</sup> wieder erwähnt, der es bei der trockenen Destillation von Benzylsulfid und Benzyldisulfid neben anderen Produkten gewann.

Die richtige Formel für Tetraphenylthiophen  $C_{28}H_{20}S$  ermittelte erst M. Fleischer<sup>3)</sup> im Jahre 1866, der den Stoff auch bei der Destillation von Sulfobenzol (Benzylsulfid) erhielt. Mit Brom stellte er Tribromthionessal her und mit rauchender Salpetersäure ein Tetranitroderivat, auf welches im Laufe der Ausführungen noch Bezug genommen wird.

J. Dorn<sup>4)</sup> und C. Forst<sup>5)</sup> untersuchten im Jahre 1875 ebenfalls die bei der trockenen Destillation von Benzylsulfid auftretenden Reaktionsprodukte. Ersterer stellte aus Thionessal ein Dichlorderivat her und nahm außerdem Oxydationsversuche mit Salzsäure und Kaliumchlorat vor.

Br. Radziszewski<sup>6)</sup> erhielt Thionessal neben Stilben beim trockenen Erhitzen von phenyleffigsauren Barium mit Schwefel, aber erst Ziegler<sup>7)</sup> sprach das beim Zusammenschmelzen von Phenyleffigsäure mit Schwefel neben Stilben erhaltene Produkt als Tetraphenylthiophen an. In geringer Menge erhielt er es auch beim Schmelzen von Desoxybenzoin mit Schwefel.

Bei allen bisher genannten Autoren sind über die Mengenverhältnisse der entstehenden Produkte keine zahlenmäßigen Angaben zu finden. Erst nachdem E. Baumann und M. Klett<sup>8)</sup> feststellten, daß Thionessal vermutlich nicht als primäres Zer-

setzungsprodukt bei der trockenen Destillation von Thiobenzaldehyd auftritt, sondern erst sekundär durch Einwirkung von Schwefel auf das gebildete Stilben entsteht, stellten sie Thionessal durch Schmelzen von Stilben mit Schwefel dar und gaben eine Ausbeute von 60—70% an. Die von diesen Verfassern festgestellte hellrote Lösungsfarbe des Thionessals in konz. Schwefelsäure konnte mit auf gleiche und andere Weise hergestelltem Tetraphenylthiophen nicht erhalten werden.

Nach L. Aronstein und A. van Nierop<sup>9)</sup> entsteht ferner Thionessal neben Stilben beim Erhitzen von Toluol mit Schwefel im Einschlußrohr.


In zwei ausführlicheren Untersuchungen befaßten sich E. Fromm und O. Acher<sup>10)</sup> und E. Fromm und Ph. Schmoldt<sup>11)</sup> mit Thionessal, welches sie durch trockene Destillation von Benzoyldisulfid, Benzoylsulfid und ferner beim Erhitzen von thiolbenzoesäurem Natrium erhielten. Sie untersuchten genauer die zahlreichen Nebenprodukte, die bei ihrer Methode entstanden, brachten aber zur Chemie des Thionessals nicht viel Neues bei außer der Feststellung, daß Tetraphenylthiophen in Benzol-Alkohol mit Zink und Salzsäure den Schwefel als Schwefelwasserstoff abspaltet und dabei zum Teil in Tetraphenylbutan übergeht.

1915 oxydierte O. Hinsberg<sup>12)</sup> das Thionessal mit Wasserstoffsuperoxyd in Eisessig auf dem Wasserbad zum S-Dioxyd vom Smp. 267°. Diese Oxydation erfolgt schneller in siedendem Eisessig, und das aus Pyridin umkristallisierte Produkt erhält man in gelben Nadeln, die einen Smp. von 276° aufweisen.

H. Staudinger und J. Siegwart<sup>13)</sup> erhielten 1916 Tetraphenylthiophen durch Zersetzen von Diphenylthiodiazol. Da als Ausgangsprodukt das leicht erreichbare Benzil dient, wäre die Möglichkeit, Thionessal auf diese Weise herzustellen, in Erwägung zu ziehen, doch ist die Überführung von Phenylbenzoyldiazomethan in Diphenylthiodiazol anscheinend mit großen Verlusten verbunden, so daß letzten Endes aus 20 gr Benzil 3,5 gr Tetraphenylthiophen erhalten werden.

Beim Erhitzen von Dibenzyl mit Schwefel, von Benzylalkohol mit Schwefel und ferner von Benzyläther mit Schwefel erhielten L. Szperl und T. Wierusz-Kowalski<sup>14)</sup> im Jahre 1918 Tetraphenylthiophen und zwar bei den beiden letztgenannten Versuchen als Nebenprodukt. Ausbeuten sind aber auch beim ersten Versuch nicht angegeben.

Schließlich gelang es W. Dilthey, W. Schommer, W. Höschen und H. Dierichs<sup>15)</sup> im Jahre 1935 Tetraphenylthiophen durch Schmelzen von Tetraphenylcyklopentadienon mit Schwefel herzustellen.



Wie schon ausgeführt, finden sich in der Literatur nur bei wenigen Autoren Angaben über die erhaltenen Ausbeuten an Thioneffal. So erwähnen nur E. Baumann und M. Klett<sup>16)</sup> bei der Darstellung von Thioneffal aus Stilben mit Schwefel eine 60—70%ige Ausbeute. Diese kann nach Untersuchungen von E. Fromm und O. Achert<sup>17)</sup> nicht übertroffen werden, da sich als Nebenprodukt Toluol und Tetraphenylbutan bilden. Da nun Stilben kein gerade billiges Ausgangsmaterial ist, dürfte die Darstellung nach W. Dilthey aus Benzil und Dibenzylketon über Tetraphenylcyklopentadienon das praktischste Verfahren zur Herstellung größerer Mengen von Tetraphenylthiophen sein, denn die Ausgangsmaterialien sind leicht und in guter Ausbeute zu erhalten. Die Ausbeute an Thioneffal aus Tetracyklon beträgt 70—75%.

## II. Nitrierung von Tetraphenylthiophen.

Obwohl Tetraphenylthiophen schon sehr lange bekannt ist, fehlt es doch sozusagen ganz an Derivaten, die man aus ihm erhalten könnte. Zwar haben verschiedene der genannten Autoren Nitrierungsversuche angestellt, haben auch wohl immer stickstoff-

haltige Produkte erhalten, waren aber meistens nicht imstande, reine Nitrokörper zu gewinnen. Nur M. Fleischer<sup>3)</sup> beschreibt ein Tetranitroderivat. Seine Ausführungen lauten: „Rauchende Salpetersäure wirkt heftig auf Thionessal ein. Das erste Produkt ist eine Nitroverbindung  $C_{28}H_{16}(NO_2)_4S$ , darauf bildet sich eine schwefelfreie Nitroverbindung  $C_{14}H_{10}(NO_2)_2O_3$  und zuletzt Nitrodrazylsäure,  $C_7H_5(NO_2)O_2$ . Der Schwefel wird vollständig als Schwefelsäure abgeschieden.“

Das erhaltene Nitrothionessal  $C_{28}H_{16}(NO_2)_4S$  ist als ein hellgelbes, amorphes Pulver beschrieben, das über  $250^\circ$  schmilzt. Über die Stellung der Nitrogruppen wird nichts ausdrückliches gesagt, aber aus dem Umstand, daß Nitrodrazylsäure (p-Nitrobenzoesäure) als Oxydationsendprodukt dieses Prozesses angesehen wird, wäre zu schließen, daß sie p-ständig in den Phenylkernen stehen.

Bei Wiederholung des Versuches konnte kein Tetra-, sondern nur ein Hexanitroprodukt erhalten werden, obwohl die Temperatur im Gegensatz zu Fleischers Versuchen auf  $0^\circ$  gehalten wurde. Rechnet man die Analysenwerte Fleischers auf einen Hexanitrokörper um, so stellt man fest, daß seine Ergebnisse auf einen solchen viel besser stimmen würden:

$$\begin{array}{rcl} C_{28}H_{14}S(NO_2)_6 & 4,86\% & S \\ C_{28}H_{16}S(NO_2)_4 & 5,6\% & S \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} C_{28}H_{14}S(NO_2)_6 \\ C_{28}H_{16}S(NO_2)_4 \end{array}} \right\} \text{gef. } 4,8\% \quad S$$

Für ein Hexanitroprodukt spricht auch die Feststellung von W. Steinkopf<sup>18)</sup>, der beim Behandeln von Flavophen — das er aus Thionessal beim Verbacken mit Aluminiumchlorid erhielt — mit rauchender Salpetersäure einen Hexanitrokörper bekam.

Bei dem Tiefstand unserer Kenntnisse über die Nitrierung des Thionessals und der Tatsache, daß eine Reihe namhafter Forscher sich mit der Nitrierung des Tetraphenylthiophens befaßt hatten, schien eine Inangriffnahme dieses Problems zunächst wenig aussichtsvoll. Allerdings ließ die Durchsicht der Literatur vermuten, daß der Angriff der Salpetersäure gar nicht so schwierig erfolgt, weil ja ein Eintritt von 4 oder sogar 6 Nitrogruppen beobachtet werden konnte.

Da nun zu erwarten war, daß Thionessal nicht auf den ersten Schlag gleich 4 bzw. 6 Nitrogruppen annehmen, sondern daß die Nitrierung stufenweise erfolgen würde, ging man dazu über, unter ganz milden Bedingungen zu nitrieren.

Die hier ausgesprochenen Erwartungen gingen in Erfüllung. Es zeigte sich bald, daß bei der Nitrierung mit erheblich verdünnter Salpetersäure gearbeitet werden könnte. Als Verdünnungsmittel war der Löslichkeitsverhältnisse des Tetraphenylthiophens wegen ein organisches Lösungsmittel, und zwar Eisessig angezeigt. Eine Lösung von 10 g konz. Salpetersäure in 100 ccm Eisessig greift zwar das Thionessal nicht oder zu langsam an, es erfolgt auch keine Lösung. Beim Erwärmen kommt es zur Auflösung und Nitrierung. Das beim Erkalten ausfallende gelbe Produkt erweist sich als ein Dinitrotetraphenylthiophen vom Smp. 216°, während ein leichter lösliches Dinitroprodukt vom Smp. 168° durch Fällen mit Wasser noch aus dem Filtrat erhalten werden konnte. Von diesen beiden Derivaten des Thionessals entsteht das erstgenannte bei weitem als Hauptprodukt.

Um ein Mononitrothionessal zu erhalten, mußte die Salpetersäure in der berechneten Menge zur Anwendung kommen, was in Form von Kaliumnitrat mit Schwefelsäure geschah. Auf diese Weise gelang es dann, das Mononitrotetraphenylthiophen zu fassen. Ferner wurde Mononitrothionessaldioxyd aus Thionessaldioxyd durch Nitrieren bei Gegenwart von konz. Schwefelsäure hergestellt. Das Produkt ist identisch mit dem Oxydationsprodukt von Mononitrothionessal.

Aus diesen Versuchen geht hervor, daß Thionessal mit großer Leichtigkeit nitriert werden kann.


### III. Die Stellung der Nitrogruppen.

Da von vornherein feststand, daß die Nitrogruppe in einen der Phenylkerne eingetreten war, handelte es sich um die Beantwortung der beiden Fragen:



1. Welche Stellung im Phenylkern nimmt die Nitrogruppe ein?

2. In welchen Phenylkern,  $\alpha$ - oder  $\beta$ -ständigen, ist sie eingetreten?

Relativ einfach ließ sich die erste Frage beantworten. Oxydationsversuche mit Mononitrothioneßal sowie seines Sulfons — die Sulfide ließen sich mit Perhydrol leicht in die Sulfone überführen, wie schon O. Hinsberg <sup>12)</sup> beim Thioneßal gezeigt hat — hinterließen die Nitrogruppe stets als p-Nitrobenzoesäure, so daß die p-Stellung der Nitrogruppe gesichert ist.



Die zweite Frage, ob die Nitrogruppe in einem der  $\alpha$ - oder  $\beta$ -ständigen Phenylkerne eintritt, ob also Formel IIIa oder b anzu-



nehmen ist, wäre entscheidend nur zu beantworten gewesen durch die Auffindung eines für die Stellung charakteristischen Zwischenproduktes der Oxydationsversuche. Obgleich erfolgversprechende Ansätze keineswegs fehlen, gelang es leider bisher nicht, ein solches aufzufinden.

Einen gewissen Fingerzeig dürften die Halochromieerscheinungen dieser Nitrokörper bieten. Es wurde nämlich beobachtet, daß Nitrothioneßal-S-dioxyde in Pyridinlösung mit Natriummethylat lebhaft Farbercheinungen zeigten, die nur bei gleichzeitigem Vorhandensein von Sulfon- und Nitrogruppen auftrat. Weder Thioneßal und Thioneßaldioxyd, noch Mono- oder Dinitrothioneßale geben mit Alkali eine nennenswerte Färbung, liegen aber Nitro-Sulfone vor, dann ist die Halochromie recht erheblich.

Folgende Salzfarben treten in Pyridin mit Natriummethylat auf:


Dinitrothioneffal-S-dioxyd Smp. 294° veilftichig rot

Dinitrothioneffal-S-dioxyd Smp. 194° „ „

Mononitrothioneffal-S-dioxyd Smp. 250° „ „

Die Farben sind nur schwer zu unterscheiden.

Die Halochromie des erstgenannten Stoffes ist nun sehr ähnlich der des schon von W. R. Waldron und E. Emmet Reid<sup>19)</sup> dargestellten pp'-Dinitrodibenzylsulfons, das zu Vergleichszwecken aus pp'-Dinitrodibenzylsulfid durch Oxydation bereitet wurde.





Während das Dinitrodibenzylsulfid keine charakteristische Farbe mit Alkali zeigt, gibt das Sulfon eine tiefviolette Farbe, die im Ton nur etwas violetter ist, als die des Dinitrothioneffal-S-dioxyds vom Smp. 294°. Beide Halochromien sind gegen wenig Wasser recht beständig, mit mehr Wasser verschwindet die Farbe des Dinitrothioneffal-S-dioxyds zuerst.

Ordnet man die beiden Nitrogruppen im Dinitrothioneffal-S-dioxyd so an, wie in Formel VIa, so hätte man eine der Formel A des Dinitrodibenzylsulfons wesensgleiche Stellung aller wichtigen Gruppen, und man könnte die Formel VIa als wahrscheinlich für diesen Dinitrokörper ansehen.

Die Darstellung und Untersuchung des Mononitrothioneffal-S-dioxyds vom Smp. 250° hat nun aber gezeigt, daß auch dieses mit Alkali in Pyridinlösung eine veilftichig rote Lösung gibt, die von der des Dinitrothioneffal-S-dioxyds (Smp. 294°) in der Farbe kaum zu unterscheiden ist. Zur Erzeugung der roten Farbe genügt daher eine Nitrogruppe zusammen mit der SO<sub>2</sub>-Gruppe.

Um diese Halochromieerscheinungen für die Stellung der Nitrogruppen ausnutzen zu können, mußte die Frage nach dem Zustandekommen der Farbe erörtert werden. Daß die Farbe einer Salzbildung folgt, dürfte kaum zweifelhaft sein. Ebenso, daß bei den beiden Stoffen die Salzbildung verschiedener Art sein kann. Genaue Untersuchungen liegen auf diesem Gebiet nicht vor, sie sind auch schwierig, da solche Alkalisalze zu unbeständig sind und unerläßliche Reinigungs- oder Kristallisationsversuche meist nicht ertragen.<sup>20)</sup> Es ist dabei nur als wahrscheinliche Annahme zu bewerten, daß das Natriumfalz des Körpers A durch Ersatz entsteht (Formel A'), während das Farbsalz des Dinitrothionessal-S-dioxyds



(Formel IV) nur durch Anlagerung entstanden gedacht werden kann (Formel IV'). Vergleicht man jedoch die beiden Formeln IV' und A', so erkennt man in beiden sehr ähnlich gebaute Carbeniate, die sehr wohl gleiche Grundfarbe haben könnten, während die geringe hypsochrome Verschiebung von IV' nach A' auf dem Ring-schluß beruhen könnte. Selbstredend ist die Farberscheinung kein Beweis für die p-Stellung im  $\alpha$ -ständigen Phenylkern, da vermutlich o- oder m-ständige NO<sub>2</sub>-Gruppen, wie bei den Nitrophenolen

and further down the page, the following is written: "The first of these is the fact that the first of the three is the first of the three." This is a very interesting observation, and it is one that is often overlooked. It is a fact that is often overlooked, and it is one that is often overlooked.

The second of these is the fact that the second of the three is the second of the three. This is a very interesting observation, and it is one that is often overlooked. It is a fact that is often overlooked, and it is one that is often overlooked.






The third of these is the fact that the third of the three is the third of the three. This is a very interesting observation, and it is one that is often overlooked. It is a fact that is often overlooked, and it is one that is often overlooked.

The fourth of these is the fact that the fourth of the three is the fourth of the three. This is a very interesting observation, and it is one that is often overlooked. It is a fact that is often overlooked, and it is one that is often overlooked.

Für diese geben vielleicht die Schmelzpunkte der Nitrokörper eine Handhabe. Es zeigt sich nämlich, daß Tetraphenylthiophenderivate ebenso wie andere hochphenylierte Körper — wie ein Blick auf die Tabelle zeigt (S. 16a) — größere Schmelzpunktschwankungen aufweisen, je nachdem ob symmetrischer oder asymmetrischer Bau vorliegt. Während sonst im allgemeinen der Eintritt einer Nitrogruppe in die p-Stellung mit einer Schmelzpunktserhöhung einhergeht, schmilzt Mononitrothioneßal bei  $179^{\circ}$ , also  $5^{\circ}$  niedriger als Thioneßal vom Smp.  $184^{\circ}$ . Ebenso ist das Verhältnis der Schmelzpunkte bei den Sulfonen. Thioneßal-S-dioxyd schmilzt bei  $276^{\circ}$ , während Mononitrothioneßal-S-dioxyd bei  $250^{\circ}$  schmilzt. Die durch eine Nitrogruppe herbeigeführte Asymmetrie bewirkt also ein Herabgehen des Schmelzpunktes.

Bei den beiden Dinitroderivaten (Smp.  $216^{\circ}$  und  $168^{\circ}$ ) geht gegenüber dem Smp. der Mononitroverbindung ( $179^{\circ}$ ) der Smp. in einem Fall hinauf ( $216^{\circ}$ ), im anderen Fall hinunter ( $168^{\circ}$ ). Ebenso liegen die Schmelzpunkte der Nitrosulfone: Mononitrothioneßal-S-dioxyd schmilzt bei  $250^{\circ}$ , Dinitrothioneßal-S-dioxyd bei  $294^{\circ}$  und  $194^{\circ}$ . In dem einen Fall würde somit die Symmetrie, in dem anderen die Asymmetrie zunehmen. Man würde also dem Dinitrothioneßal vom Smp.  $216^{\circ}$  die symmetrische Formel Va zusprechen, während für das Dinitrothioneßal vom Smp.  $168^{\circ}$  die beiden unsymmetrischen Formeln Vb und Vc zur Wahl stehen. Da es nun gelang, bei einem oxydativen Abbau von Dinitrotetraphenylthiophen (Smp.  $168^{\circ}$ ) mit Chromsäure, wenn auch nur in sehr geringer Menge, Benzil zu erhalten, käme für dieses Dinitroprodukt nur die Formel Vb in Frage, da aus Vc nur ein Nitrobenzil zu erwarten gewesen wäre.

Es ist klar, daß die hier versuchte Ableitung der Konstitution der Nitrothioneßale nicht als endgültig anzusehen ist. Sie muß vielmehr durch weitere Versuche gestützt werden und dient vorläufig als Arbeitshypothese. Deshalb sollen von ihr ausgehend noch keine Schlüsse für die Stellung der Nitrogruppen im Tetranitrothioneßal — das durch Nitrieren des Dinitroproduktes vom Smp.  $216^{\circ}$  erhalten wurde — gezogen werden. Denn, obwohl die An-

|                                                                                               |                                      |              |                                                                                               |                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Farbe:<br>gelb                                                                                | In Pyridin<br>+ Methylat:<br>braun   | Smp.<br>284° | Farbe:<br>farblos                                                                             | In Pyridin<br>+ Methylat:<br>farblos        | Smp.<br>184° |
| Hexanitrothionessal                                                                           |                                      |              |  <p>I</p>    |                                             |              |
| Farbe:<br>gelb                                                                                | —                                    | Smp.<br>179° | Farbe:<br>gelb                                                                                | In Pyridin<br>+ Methylat:<br>gelb-bräunlich | Smp.<br>276° |
|  <p>IIIa</p> |                                      |              |  <p>II</p>   |                                             |              |
| Farbe:<br>o.-gelb                                                                             | In Pyridin<br>+ Methylat:<br>veilrot | Smp.<br>250° | Farbe:<br>farblos                                                                             | In Pyridin<br>+ Methylat:<br>violett        | Smp.<br>260° |
|  <p>IV</p> |                                      |              |  <p>A</p> |                                             |              |



nahme nahe liegt, daß im Tetranitroprodukt (Smp. 302°) alle vier Nitrogruppen in p-Stellungen der Benzolkerne stehen, zeigt die Möglichkeit der Darstellung eines Hexanitrothioneffals, daß außer den vier p-Stellungen auch noch andere für die Substitution in Frage kommen, über die bisher allerdings noch nichts ausgefragt werden kann, da die nähere Untersuchung, die beabsichtigt ist, noch aussteht.

## V. Konstitutionsbeweisende Kondensationsversuche.

Einen eindeutigen Beweis für die Stellung der Nitrogruppen im Dinitrothioneffal bzw. seinem Sulfon hätte die Synthese eines solchen Körpers aus nitrierten Teilprodukten geliefert. Von der Überlegung ausgehend, daß im p-Nitrotoluol die Wasserstoffatome der  $\text{CH}_3$ -Gruppe durch die p-ständige Nitrogruppe bedeutend reaktionsfähiger werden als sie im Toluol sind, hätten z. B. im pp'-Dinitrodibenzylsulfid die Nitrogruppen eine auflockernde Wirkung auf die Wasserstoffatome der  $\text{CH}_3$ -Gruppe ausüben können. Dieser Wirkung wäre allerdings diejenige des Schwefels, der ja positivierend wirkt, entgegengerichtet. Wenn man jedoch statt des Sulfids das entsprechende Sulfon nähme, so wäre von dieser Verbindung zu erwarten gewesen, daß sie auf Grund der acidifizierenden Wirkung ihrer sämtlichen Substituenten reaktionsfähige Wasserstoffatome in der Methylengruppe aufweisen würde. Bei Verbindungen vom Typus  $\text{R-SO}_2\text{-CH}_2\text{-SO}_2\text{-R}$  gelang es R. L. S h r i n e r, H. C. S t u c k und W. J. J o r i s o n <sup>20)</sup> C-Alkyl-Derivate herzustellen, F. A r n d t und C. M a r t i u s <sup>20)</sup> erhielten aus Trimethylentrifulfon mit Diazomethan ein Hexaalkyl-Derivat, aber O. H i n s b e r g <sup>21)</sup> und J. T r ö g e r und E. N o l t e <sup>22)</sup> stellten bei Körpern der Klasse  $\text{X-C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{-CH}_2\text{-C}_6\text{H}_5$  fest, daß sie nicht mit Aldehyden zu reagieren vermögen.

Die Versuche pp'-Dinitrodibenzylsulfon mit Benzil unter den verschiedensten Bedingungen zu kondensieren, verliefen ebenfalls sämtlich negativ, ebenso gelang es nicht, mit p-Bromderivaten zu kondensieren.

## VI. Aminoderivate des Tetraphenylthiophens.

Die Nitrokörper ließen sich mit Zinnchlorür und Salzsäure in Eisessig leicht in die entsprechenden Aminoderivate überführen. In Lösung sind diese an sich farblosen Amine zwar oxydationsempfindlich, aber im festen Zustand sind sie durchaus beständig.

Das  $\alpha$ -4-Aminothionessal bildet farblose Nadelchen und schmilzt bei 205°. Das Hydrochlorid dieser Verbindung ist in Eisessig gut diazotierbar, und aus der orangeroten Lösung kann man mit Überchlorsäure ein haltbares, goldbraunes Diazoniumsalz erhalten. Die Lösungsfarbe des Amins sowie seiner Derivate (Azomethin, Acetyl-derivat) in konz. Schwefelsäure ist orange-gelb. Die alkoholische Lösung dieser Stoffe fluoresziert schwach blau.

Das Reduktionsprodukt von  $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrothionessal kristallisiert ebenfalls in farblosen Nadeln, die bei 273° schmelzen. Es löst sich in konz. Schwefelsäure mit orangeroter Farbe, die beim Verdünnen mit Wasser nach blau umschlägt und läßt sich sowohl in Schwefelsäure als auch in Eisessig mit Natriumnitrit diazotieren. Die Diazoniumsalzlösung ist orangefarbig. Sie gibt mit Pikrinsäure wohl eine gelbe Fällung, die sich aber beim Filtrieren zersetzt. Mit  $\beta$ -Naphthol erhält man in alkalischer Lösung ein rotes Kupplungsprodukt, das sich in konz. Schwefelsäure mit dunkelblauer Farbe löst. Bei allen Versuchen, Benzoylierung, Acetylierung etc. reagierten immer beide Aminogruppen und es gelang nicht, mit milderem Reduktionsmitteln nur eine Nitrogruppe zu reduzieren.

Vom  $\alpha\beta$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen wurde ebenfalls ein Diaminoderivat hergestellt vom Smp. 220°. Da das Ausgangsprodukt nur in geringer Menge als Nebenprodukt bei der Nitrierung von Thionessal auftritt, wurden von den vorhandenen Mengen des Amins keine Derivate hergestellt. Das Produkt löst sich ebenfalls in konz. Schwefelsäure mit oranger Farbe und ist in organischen Lösungsmitteln weniger oxydationsempfindlich als das andere Diamin.

## VII. Zusammenfassung.

- I. Durch Nitrieren von Tetraphenylthiophen konnten erstmalig ein Mononitroderivat und zwei Dinitroderivate hergestellt werden. Im Mononitrokörper befindet sich die Nitrogruppe p-ständig im  $\alpha$ -Phenylkern, bei den beiden Dinitrokörpern nimmt eine Nitrogruppe die gleiche Stellung ein, die zweite steht bei dem hochschmelzenden Produkt p-ständig im  $\alpha'$ -Kern, beim tiefschmelzenden im  $\beta$ -Kern. Es wurden ferner Tetranitro- und Hexanitrotetraphenylthiophen dargestellt.
  - II. Die Sulfone der genannten Verbindungen gaben intensiv gefärbte Alkalifalze in organischen Lösungsmitteln.
  - III. Die Nitrokörper wurden zu den entsprechenden Aminen reduziert und von diesen weitere Derivate hergestellt.
-

## EXPERIMENTELLER TEIL.

### I. Tetraphenylthiophen.<sup>15)</sup>



1 Mol Tetraphenylcyklopentadienon wird mit 3 — 4 Mol Schwefel im Mörser verrieben und in einem enghalsigen Kolben unter Aufleiten von Kohlenäure verschmolzen. Bei 270° tritt unter Kohlenoxydentwicklung Reaktion ein. Die Temperatur wird auf 340—350° gesteigert, da der Prozeß sonst zu langsam verläuft und ein großer Teil des schon gebildeten Thionessals mit Schwefel absublimiert. Die Farbe der Schmelze muß am Ende des Prozesses dunkelbraun sein, da Reste von unverändertem roten Keton sich durch Umkristallisieren schlecht entfernen lassen. Die erkaltete Schmelze wird mit heißem Benzol ausgezogen und das erhaltene Thionessal auf dem Filter mit kaltem Benzol gewaschen und umkristallisiert. Die farblosen Nadeln schmelzen bei 184°. Die Ausbeuten betrugen bei Ansätzen von:

50 g Keton mit 15 g Schwefel 37 g Thionessal bis 340° Temp.  
 50 g Keton mit 10 g Schwefel 33 g Thionessal bis 310° Temp.  
 65 g Keton mit 12 g Schwefel 47 g Thionessal bis 320° Temp.

### II. Nitrierungsprodukte von Tetraphenylthiophen.

#### 1. $\alpha$ -4-Nitrotetraphenylthiophen.



4 g Tetraphenylthiophen werden mit 1,5 g Kaliumnitrat fein zerrieben, in 80 ccm Eisessig aufgeschlemmt und auf ein siedendes

Wasserbad gebracht. Unter Umschütteln gibt man tropfenweise etwas mehr als die berechnete Menge konz. Schwefelsäure hinzu. (Bei obigem Ansatz etwa 8—10 Tropfen.) Die Substanz geht unter Gelbfärbung in Lösung. Nach einer Stunde ist die Nitrierung beendet und beim Erkalten des Lösungsmittels scheiden sich gelbe Kristalle ab. Nach 2—3maligem Umkristallisieren bleibt der Smp. bei 179°. Eventuell unverändertes Thionessal ist durch Umkristallisieren nicht gut zu entfernen, und es empfiehlt sich in solchem Fall die Nitrierung zu wiederholen. Die Ausbeute beträgt etwa 60% der Theorie. Mononitrothionessal ist löslich in Pyridin, Benzol, Aceton, Eisessig und Essigsäureanhydrid. Schwerer in Alkohol und unlöslich in Äther.

24,75 mg Subst. 70,40 mg CO<sub>2</sub>, 10,01 mg H<sub>2</sub>O

5,364 mg Subst. 0,152 ccm, 760 mm, 18°<sup>23)</sup>

C<sub>28</sub>H<sub>19</sub>O<sub>2</sub>NS

Ber. C 77,59% H 4,38% N 3,24%

Gef. C 77,22% H 4,52% N 3,32%

## 2. α-4-Aminotetraphenylthiophen.



11 g Zinnchlorür werden in 50 ccm Eisessig gegeben und bis zur vollständigen Lösung des Salzes Chlorwasserstoffgas eingeleitet. In diese Lösung wird dann unter Turbinieren in der Siedehitze eine Aufschlemmung von 4,2 g fein zerriebenem Mononitroprodukt in 40 ccm Eisessig in mehreren Portionen zugegeben. Die reduzierte Lösung ist fast farblos. Beim Erkalten fällt das Zinn Salz des Amins vollständig aus. Es wird filtriert, in einer Porzellanschale auf dem Wasserbad bis zur alkalischen Reaktion mit Alkali übergossen und unter Aufleiten von Kohlendioxyd zur Trockne eingedampft. Die pulverisierte Substanz wird mit Benzol ausgezogen und das Amin durch Verdampfen des Lösungsmittels oder durch Fällern als Hydrochlorid gewonnen. Monoaminothionessal bildet farblose Nadeln

vom Smp. 204°. Es ist leicht löslich in Benzol, Pyridin, Eisessig und Aceton. Die alkoholische Lösung fluoresziert blau. In konz. Schwefelsäure orangefarbige Halochromie.


19,83 mg Subst. 0,625 ccm 756,5 mm 23° 24)

$C_{28}H_{21}NS$

Ber. 3,47% N

Gef. 3,62% N.

3.  $\alpha$ -4-Tetraphenylthiophendiazoniumperchlorat.



Monoaminotetraphenylthiophen oder das salzsaure Salz löst sich leicht unter Zusatz von einigen Tropfen konz. Salzsäure in verdünntem Eisessig. Versetzt man eine solche Lösung mit einer wässrigen Lösung der berechneten Menge Natriumnitrit, so erhält man eine orangefarbige Diazoniumsalzlösung. In alkalischer Lösung fallen rote Kupplungsprodukte mit  $\beta$ -Naphthol, Naphthol A.S. etc. aus. Gibt man zu der Diazoniumsalzlösung einige Tropfen Überchlorsäure, so kristallisieren nach einigen Stunden schöne, goldgelbe Blättchen aus. Diese werden nach dem Filtrieren mit Äther gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Das Diazoniumperchlorat brennt auf dem Spatel ruhig ab.

2,304 mg Subst. 0,11 ccm 750 mm 18°

$C_{28}H_{19}N_2SClO_4$

Ber. N 5,45%

Gef. N 5,53%

4.  $\alpha$ -4-Oxytetraphenylthiophen.



Erwärmt man die Diazoniumsalzlösung von  $\alpha$ -4-Aminotetraphenylthiophen solange auf dem Wasserbad, bis die Lösung nicht mehr mit  $\beta$ -Naphthol reagiert, so erhält man ein bräunlich-gelbes, amorphes Produkt. Durch Umfällen aus wässrig-alkoholischem Alkali mit Säure läßt sich das Produkt reinigen. Aus verdünntem Alkohol fallen schließlich schwach bräunliche Nadeln vom Smp.  $181^\circ$  aus. Die Substanz zeigt eine blau-grüne Liebermannsche Reaktion. (Thionessal eine olivgrüne.) Sie bildet in alkalischer Lösung ein gelbes Natriumsalz.

4,871 mg Subst. 14,510 mg  $\text{CO}_2$  2,200 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>25)</sup>

$\text{C}_{28}\text{H}_{20}\text{OS}$

Ber. C 81,16% H 4,83%

Gef. C 81,24% H 5,05%

#### 5. $\alpha$ -4-Acetylaminotetraphenylthiophen.

Monoaminothionessal wird in der Kälte in reinem Pyridin gelöst (Lösungsfarbe ist gelblich mit schwach blauer Fluoreszenz), und mit der berechneten Menge Acetylchlorid versetzt. Nach mehrmaligem Umschütteln und  $\frac{1}{2}$ stündigem Stehenlassen bei Zimmertemperatur wird mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt. Das ausgefallene Acetylprodukt wird filtriert, mit Wasser gewaschen, getrocknet und aus Toluol umkristallisiert. Das Produkt bildet farblose Kristalle vom Smp.  $258^\circ$ . Die Lösung in konz. Schwefelsäure ist intensiv orangefarbig.

6,426 mg Subst. 0,193 ccm 756 mm  $24^\circ$

$\text{C}_{30}\text{H}_{28}\text{ONS}$

Ber. N 3,14%

Gef. N 3,42%

#### 6. $\alpha$ -4-Anisalaminotetraphenylthiophen.

In die heiße, blau fluoreszierende, alkoholische Lösung des Aminotetraphenylthiophens wird etwas mehr als die berechnete Menge Anisaldehyd gegeben. Die gelbe Lösung wird noch eine halbe Stunde zum Sieden erhitzt, dann eingengt und erkalten gelassen. Das Azomethin kristallisiert in schwach gelben Nadeln aus. Nach

forgfältigem Wafchen mit verdünntem Alkohol und Äther blieb der Smp. bei 201°.


7,906 mg Subst. 0,193 ccm 757 mm 20°

$C_{36}H_{27}ONS$

Ber. N 2,68%

Gef. N 2,83%

# 7. $\alpha$ -4-Nitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd.



2 g Mononitrothionessal werden fein zerrieben in 40 ccm Sulfoessigsäure suspendiert und auf heißem Wasserbad mit einer Mischung von 10 ccm Eisessig, 5 ccm Anhydrid und 10 ccm Perhydrol veretzt. Die Lösung wird turbinirt und ist nach erfolgter Oxydation orangegelb. Es wird mit Wasser gefällt, filtriert und aus Eisessig umkristallisiert. Man erhält dicke, goldgelbe Nadeln, die zur Schmelzpunktbestimmung pulverisiert und nochmals getrocknet werden müssen. Smp. 250°.

In Pyridin zeigt die Substanz mit Natriummethylat eine intensiv veil-rote Halochromie. Die Oxydation läßt sich auch in Eisessig mit Perhydrol auf dem Wasserbad durchführen, dauert aber bedeutend länger und verläuft unvollständig.

27,52 mg Subst. 72,99 mg  $CO_2$  10,18 mg  $H_2O$

$C_{28}H_{19}O_4NS$

Ber. C 72,24% H 4,1%

Gef. C 72,33% H 4,14%

# 8. Oxydation von $\alpha$ -4-Acetylaminotetraphenylthiophen.

Es sollte versucht werden, das Sulfon dieser Verbindung zu erhalten.

1,5 g Acetylprodukt wurden deshalb nach der oben angegebenen Methode in Sulfoessigsäure mit Wasserstoffsuperoxyd oxydiert. Die Lösung wurde intensiv gelb. Mit Wasser wurde ein gelbes Produkt gefällt das nach oftmaligem Umkristallisieren aus Aceton und Eisessig den Smp.  $245^{\circ}$  zeigte und mit Mononitrosulfon vom Smp.  $249-250^{\circ}$  keine Schmelzpunktsdepression gab. Die Ausbeute war nur gering, da der größte Teil der Substanz verharzte.

#### 9. Ozonabbau von Mononitrothioneffal-S-dioxyd.

In eine Lösung von 5 g Mononitrothioneffal-S-dioxyd in 40 ccm Aceton wurde in der Siedehitze 3 Stunden lang Ozon eingeleitet. Auf Zusatz von Wasser schied sich ein dunkles Öl aus der braunen Lösung aus. Beim Erhitzen und Abdampfen des überschüssigen Acetons auf dem Wasserbad fielen daraus farblose Nadeln aus, die vom Harz getrennt wurden und nach dem Trocknen 1,2 g Säure ergaben. Beim Trocknen über  $100^{\circ}$  sublimierten hieraus lange blättrige Nadeln vom Smp.  $121^{\circ}$ , deren Mischschmelzpunkt mit Benzoesäure keine Depressionen zeigte. Aus dem oben erhaltenen Harz wurden noch 0,5 g unverändertes Ausgangsprodukt zurück-erhalten. Weitere Stoffe konnten nicht daraus isoliert werden.

Die von Benzoesäure befreite Nitrobenzoesäure hatte einen Smp. von  $228^{\circ}$ . Mit p-Nitrobenzoesäure vom Smp.  $238^{\circ}$  war der Mischschmelzpunkt bei  $234^{\circ}$ .

Der Ozonabbau von Mononitrothioneffal-S-dioxyd wurde mit 2 g in 20 ccm Eisessig und 5 ccm Essigsäureanhydrid wiederholt. Es wurde im ganzen 5 Stunden lang in der Siedehitze Ozon eingeleitet. Nach dem Verdünnen mit Wasser wurde alkalisch gemacht, wobei ein starker Geruch nach Benzaldehyd auftrat und dann filtriert. Als Rückstand blieb 1,5 g gelbes Harz. Das Filtrat wurde angesäuert und fünfmal ausgeäthert. Nach Verdampfen des Äthers wurden 0,5 g Säure erhalten vom Smp.  $170^{\circ}$ . Nach dem Umkristallisieren aus Ligroin stieg der Smp. auf  $210^{\circ}$  und später auf  $225^{\circ}$ . Der Mischschmelzpunkt mit p-Nitrobenzoesäure war bei  $234^{\circ}$ .


Das gelbe Harz wurde aus Eisessig mehrmals umkristallisiert

und hatte schließlich den Smp. 222°. Die gelben Kristalle gaben eine tieferfarbige Halochromie mit Methylat und Pyridin als das Ausgangsmaterial.

4,701 mg Subst. 0,117 ccm 750 mm 18°

Gef. 2,88% N.

1.  $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrothioneffal und  $\alpha\beta$ -44'-Dinitrothioneffal.



In eine Suspension von 5 g Tetraphenylthiophen in 100 ccm Eisessig wird unter Erwärmen auf dem siedenden Wasserbad aus einem Tropftrichter innerhalb einer Stunde eine Mischung von 10 g konz. Salpetersäure und 10 ccm Eisessig eingetropft. Die Substanz geht vollständig in Lösung. Aus der intensiv gelben Lösung scheiden sich nach weiterem Erwärmen auf dem Wasserbad lange Nadeln ab, die nach dem Erkalten filtriert und mit Eisessig gewaschen werden. Nach dem Umkristallisieren aus Eisessig ist der Smp. 216°.

Die Substanz ist löslich in Benzol, Toluol, Pyridin, Eisessig, Essigsäureanhydrid, Aceton und Dioxan. Wenig in Alkohol und unlöslich in Äther.

Die Ausbeute beträgt 60—65% der Theorie und variiert mit der Reinheit des Ausgangsmaterials.

28,05 mg Subst. 72,11 mg CO<sub>2</sub> 9,61 mg H<sub>2</sub>O <sup>26)</sup>

6,561 mg Subst. 0,338 ccm 758,5 mm 23°

C<sub>28</sub>H<sub>18</sub>O<sub>4</sub>N<sub>2</sub>S

Ber. C 70,29% H 3,77% N 5,85%

Gef. C 70,10% H 3,83% N 5,93%

Aus der Mutterlauge wird nach dem Einengen und Verätzen mit Wasser noch eine Kristallfraktion erhalten die zwischen 158—167° schmilzt. Nach oftmaligem Umkristallisieren aus

Eisessig bleibt der Smp. konstant bei 168°. Es sind derbe, gelbe Kristalle, die unter dem Mikroskop undurchsichtig erscheinen. Die Analyse beweist, daß es sich hier auch um ein Dinitroprodukt handelt.

Der Körper ist etwas leichter löslich als der höher schmelzende. In der Kälte löslich in Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und Dioxan. Gut löslich in Benzol, Pyridin und Aceton. Wenig in Alkohol und unlöslich in Äther.

Die Ausbeuten an niedrig schmelzendem Rohprodukt betragen 13—16% der Theorie.

4,295 mg Subst. 11,03 mg CO<sub>2</sub> 1,473 mg H<sub>2</sub>O <sup>27)</sup>.

8,937 mg Subst. 0,476 ccm 759 mm 23° <sup>23)</sup>

C<sub>28</sub>H<sub>18</sub>O<sub>4</sub>N<sub>2</sub>S

Ber. C 70,29% H 3,77% N 5,85%

Gef. C 70,04% H 3,84% N 6,12%

## 2. 22'-44'-Diaminotetraphenylthiophen.



15 g Zinnchlorür werden in 50 ccm Eisessig suspendiert und durch Einleiten von Chlorwasserstoffgas gelöst. In die heiße Lösung gibt man in kleinen Anteilen eine Lösung von 4,5 g Dinitroprodukt in 80 ccm Eisessig. Die Lösung wird zweckmäßig turbiniert. Das sich bildende Zinndoppelsalz fällt zum Teil als farbloses Salz aus, die Lösung bleibt aber gelbstichig. Nach dem Erkalten wird mit wenig Wasser ausgefällt, filtriert, mit Alkali übergossen und auf dem Wasserbad unter Aufleiten von Kohlendioxyd zur Trockne eingedampft. Die erhaltene, durch ausgeschiedenes Zinn bisweilen graue Masse wird pulverisiert und mit Toluol ausgezogen. Das Diamin bildet farblose Nadeln vom Smp. 273°.

Verarbeitet man die reduzierte Lösung nicht schnell hintereinander, so erhält man gelb-bräunliche Kristalle vom Smp. 265 bis 267°.

Da das Amin in Lösungsmitteln oxydationsempfindlich ist, läßt es sich durch Umkristallisieren nicht reinigen. Die Ausbeute beträgt 50—55% der Theorie. Der Körper ist gut löslich in Pyridin, Eisessig und Aceton. Schwerer in Alkohol. In konz. Schwefelsäure löst er sich mit orange-roter Farbe.

3,588 mg Subst. 10,642 mg CO<sub>2</sub> 1,652 mg H<sub>2</sub>O <sup>27)</sup>

80,54 mg Subst. 6,33 ccm 761,5 mm 23° <sup>28)</sup>

C<sub>28</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>S

Ber. C 80,38% H 5,25% N 6,7%

Gef. C 80,89% H 5,15% N 6,5%

### 3. αα'-44'-Diacetyldiaminotetraphenylthiophen.

Diaminotetraphenylthiophen wird in Essigsäureanhydrid gelöst und nach Zugabe von wasserfreiem Natriumacetat zum Sieden erhitzt. Nach dem Zersetzen mit Wasser erhält man bräunliche Kristalle, die erst nach mehrmaligem Umkristallisieren aus Essigsäureanhydrid fast farblos werden. Die Nadeln haben einen Smp. von 324,5°.

Man acetyliert besser in Pyridin mit Acetylchlorid, da beim Erhitzen in Essigsäureanhydrid teilweise Oxydation desamins eintritt.

3,415 mg Subst. 9,515 mg CO<sub>2</sub> 1,575 mg H<sub>2</sub>O <sup>27)</sup>

C<sub>32</sub>H<sub>26</sub>O<sub>2</sub>N<sub>2</sub>S

Ber. C 76,49% H 5,16%

Gef. C 76,05% H 5,18%

### 4. αα'-44'-Dibenzoyldiaminotetraphenylthiophen.

Eine Lösung von 0,4 g Diamin in 20 ccm Pyridin wird tropfenweise mit der berechneten Menge (0,3 g) Benzoylchlorid versetzt. Unter häufigem Umschütteln läßt man eine halbe Stunde stehen, versetzt mit verdünnter Schwefelsäure und filtriert den erhaltenen

Niederfchlag ab. Nach dem Trocknen wird mehrmals aus Chlorbenzol umkristallisiert. Das dibenzoylierte Diamin kristallisiert in langen, seidenglänzenden farblosen Nadeln vom Smp.  $320^{\circ}$ .

4,901 mg Subst. 14,46 mg  $\text{CO}_2$  2,12 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>25)</sup>

7,595 mg Subst. 0,289 ccm 745 mm  $17^{\circ}$  <sup>23)</sup>

$\text{C}_{42}\text{H}_{30}\text{O}_2\text{N}_2\text{S}$

Ber. C 80,51% H 4,80% N 4,47%

Gef. C 80,47% H 4,84% N 4,39%

# 5. $\alpha\alpha'$ -44'-Dianisaldiaminotetraphenylthiophen.

0,2 g Diamin werden in 250 ccm Alkohol gelöst, von eventuell nicht gelösten Bestandteilen filtriert und mit einem geringen Überschuß von Anisaldehyd versetzt. Zur besseren Kondensation fügt man einige Tropfen Pyridin hinzu. Die Farbe der Lösung wird gelb. Man läßt eine halbe Stunde fieden und erhält beim Erkalten des Lösungsmittels gelbe Nadeln, die filtriert und sorgfältig mit verdünntem Alkohol und Äther gewaschen werden. Smp.  $243^{\circ}$ . Ausbeute 0,18 g. Die Substanz ist löslich in Benzol, Toluol und Alkohol.

54,24 mg Subst. 2,205 ccm 745 mm  $18^{\circ}$  <sup>29)</sup>

$\text{C}_{44}\text{H}_{34}\text{O}_2\text{N}_2\text{S}$

Ber. N 4,3%

Gef. N 4,6%

# 6. Kupplungsprodukt von $\beta$ -Naphtol mit $\alpha\alpha'$ -44'-Diazoniumchlorid des Tetraphenylthiophens.

0,4 g Diaminothionessal werden in 40 ccm Eisessig gelöst, mit einigen Tropfen konz. Salzfäure versetzt und eine Lösung von 0,14 g Natriumnitrit in 5 ccm Wasser bei Zimmertemperatur hinzugefügt. Man erhält eine orangefarbige Diazoniumsalzlösung, aus der man mit Pikrinsäure zwar ein Diazoniumpikrat fällen kann, das aber beim Filtrieren an der Luft zerfetzt wird.

Trägt man die Diazoniumsalzlösung in eine alkalische Lösung von  $\beta$ -Naphtol ein, so erhält man eine dunkelrote Farbsalzlösung.

Nach dem Anfäuern fällt der freie Farbstoff aus. Er wird aus Benzol unter Zusatz von Alkohol in schönen, metallisch glänzenden, dunkelroten Nadeln erhalten, die einen Smp. von  $267^{\circ}$  haben. Der Farbstoff ist wenig löslich in Alkohol und Aceton, gut in Benzol und Toluol. Mit konz. Schwefelsäure wird er dunkelblau.

4,961 mg Subst. 13,56 mg  $\text{CO}_2$  1,77 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>25)</sup>

3,204 mg Subst. 0,214 ccm 759 mm  $18,5^{\circ}$  <sup>23)</sup>

$\text{C}_{48}\text{H}_{32}\text{O}_2\text{N}_4\text{S}$

Ber. C 79,1 % H 4,3 % N 7,7 %

Gef. C 78,84 % H 4,22 % N 7,81 %

### 7. Reduktionsversuch von $\alpha\alpha'$ -Dinitrothionessal in Pyridin mit Ammoniumsulfid.

Der Versuch sollte dazu dienen, nur eine von beiden Nitrogruppen zu reduzieren.

2 g Dinitroprodukt wurden in 12 ccm Pyridin gelöst und die Lösung mit etwas Methylalkohol verdünnt. Nach Zugabe von 1 ccm konz. Ammoniak wurde eine halbe Stunde Schwefelwasserstoff eingeleitet, danach eine halbe Stunde am Rückflußkühler gekocht, wieder eine halbe Stunde Schwefelwasserstoff eingeleitet, gekocht usw., im ganzen 3 mal Schwefelwasserstoff eingeleitet. Mit Wasser fielen gelbe und rote Kristalle aus, die schlecht voneinander getrennt werden konnten. Der gelbe Anteil war diazotierbar und gab nach der Kondensation mit Anisaldehyd ein Azomethin vom Smp.  $240^{\circ}$ . Die Kristalle waren gelb-braun, gaben aber mit dem Azomethin vom Smp.  $243^{\circ}$  keine Schmelzpunktsdepression. Die rote Substanz ließ sich nicht diazotieren. Aus Aceton wurden rote Nadeln erhalten, die bei  $245^{\circ}$  schmolzen. Die vorhandene Menge war noch keineswegs rein und reichte für Analysen nicht aus.


Die Reduktion mit Schwefelwasserstoff führte nach dieser Methode in der Hauptsache zu dem schon erhaltenen Diaminthionessal.

### Reduktion mit Zink in Eisessig.

1,5 g Zinkstaub wurde in eine Suspension von 3 g Dinitroprodukt in 100 ccm Eisessig eingetragen und bei Zimmertempe-

ratur 3 Stunden lang turbiniert. Die Lösung wurde orangefarbig. Nach dem Filtrieren wurde mit Alkali zur Trockne eingedampft und der pulverisierte Rückstand mit Benzol ausgezogen. Mit Methylalkohol wurde daraus ein orangefarbiges amorphes Produkt gefällt, das aus keinem Lösungsmittel zur Kristallisation gebracht werden konnte. Die Substanz war nicht diazotierbar. Molekulargewichtsbestimmungen nach Raft gaben außerordentlich schwankende Werte. Der Smp. war zwischen 180—220°. Mit konz. Schwefelsäure dunkelbraun in der Kälte, violett-rot in der Wärme.

8.  $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd.



Dieser Versuch sollte eigentlich zu einem Abbauprodukt des Dinitrothioneffals führen. Es zeigt sich aber, daß die Oxydation in Sulfoeffigsäure mit Wasserstoffsuperoxyd genau wie in Eisessig mit dem genannten Oxydationsmittel bei dem Sulfon stehen bleibt.

2 g Dinitroprodukt werden in 13 ccm Sulfoeffigsäure (dargestellt durch vorsichtiges Zusammengeben von 330 ccm Anhydrid mit 100 ccm konz. Schwefelsäure und dreistündigem Erwärmen auf dem Wasserbad bei 80°. Die Lösung ist dunkelrot) aufgeschlemmt und langsam mit einer Mischung von 10 ccm Essigsäureanhydrid, 5 ccm Eisessig und 15 ccm Perhydrol versetzt. Die Temperatur steigt dabei auf etwa 80°. Unter Turbinieren auf einem heißen Wasserbad erfolgt oberhalb dieser Temperatur lebhaftere Oxydation. Die Temperatur steigt bis 115°. Ist sie auf 95° zurückgegangen, so kann man unter dem Mikroskop an der Kristallform feststellen, ob die Substanz vollständig oxydiert worden ist. (Zuerst Nadeln, nachher dünne Blättchen.) Wenn dies der Fall ist, so wird

nach dem Erkalten filtriert, mit Eisessig gewaschen und getrocknet. Ausbeute theoretisch. Smp. des reinen Produktes  $294^{\circ}$ . Die Substanz löst sich gut in Pyridin, Benzol, Toluol, Aceton und Dioxan. Weniger gut in Alkohol und Ligroin und ist unlöslich in Äther. Mit Natriummethylat in Pyridin tritt intensive Rot-violett-färbung auf, die gegen wenig Wasser recht beständig ist. Mit viel Wasser verschwindet die Rotfärbung völlig und es flockt das gelbe Sulfon wieder aus. Weder in der Kälte noch beim Kochen in wässrig-alkoholischer Natronlauge gibt das Sulfon eine rote Färbung.

4,900 mg Subst. 11,870 mg  $\text{CO}_2$  1,600 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>25)</sup>

4,082 mg Subst. 2,00 ccm 757,5 mm  $16^{\circ}$  <sup>23)</sup>

149,32 mg Subst. 69,5 mg  $\text{BaSO}_4$  <sup>29)</sup>

$\text{C}_{28}\text{H}_{18}\text{O}_6\text{N}_2\text{S}$

Ber. C 65,88% H 3,53% N 5,49% S 6,27%

Gef. C 66,07% H 3,65% N 5,76% S 6,39%

#### 9. Titration des Alkalifalzes von $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd.

1 g Dinitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd wird in der Kälte in Pyridin gelöst und mit 5 ccm einer 5%igen Natriummethylatlösung versetzt. Aus der violetten Lösung wird mit Äther ein amorpher, violetter Körper zur Abscheidung gebracht. Es wird filtriert, mit kaltem Wasser gewaschen, mit Äther behandelt und im Vakuum getrocknet.

Eine abgewogene Menge dieser Substanz wird auf heißem Wasserbad mit Wasser zersetzt, vom ausgeschiedenen Dinitrosulfon filtriert und das Filtrat mit Salzsäure titriert (Indikator: Methylrot).

0,1105 g Subst.

0,0766 g Subst.

1,6 ccm HCl

1,2 ccm HCl

Faktor 1,2789

$\text{C}_{28}\text{H}_{18}\text{O}_6\text{N}_2\text{S} \cdot \text{NaOCH}_3$

Ber. 4,08% Na

Gef. 4,3% Na und 4,55% Na.

Nach diesen Werten lagert das Dinitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd 1 Mol Natriummethylat an.

# 10. Abbaufversuche von 22'-44'-Dinitrotetraphenylthiophen mit verschiedenen Oxydationsmitteln.

a) Mit Wasserstoffsuperoxyd in Essigsäureanhydrid und konz. Schwefelsäure.

1 g Dinitroprodukt vom Smp. 216° wurde in 30 ccm Anhydrid gelöst und mit 4,5 ccm konz. Schwefelsäure versetzt. Die erwärmte Lösung färbte sich dunkelrot. Unter Eiskühlung wurde langsam ein Gemisch von 10 ccm Essiganhydrid, 5 ccm Eisessig und 15 ccm Perhydrol zugegeben. Die Lösung erwärmte sich sehr stark, bei etwa 80° trat Reaktion ein. Die Farbe der Lösung hellte sich auf und beim Erkalten fielen dünne Blättchen von orangegelber Farbe aus. Ausbeute 0,2 g. Die Analyse entspricht einem Dinitrothionessal-S-Dioxyd.

Zu der durch Zugabe von Oxydationsmittel aufgehellten Lösung wurde in der Hitze weiter konz. Schwefelsäure zugegeben. Dabei färbte sich die Lösung wieder dunkelrot. Nach weiterer Zugabe der gleichen Menge Oxydationslösung erfolgte Reaktion und Aufhellung der Lösungsfarbe wurde mit Wasser ein gelbes Produkt gefällt, das nach dem Trocknen mit Natriummethylat in Pyridin Blau-violett färbung zeigte. Die Substanz enthält noch Schwefel. Aus Eisessig konnten Kristalle vom Smp. 239° erhalten werden.

5,030 mg Subst. 11,825 mg CO<sub>2</sub> 1,580 mg H<sub>2</sub>O <sup>25)</sup>

4,351 mg Subst. 0,210 ccm 753 mm 16° <sup>23)</sup>

Gef. C 64,12% H 3,51% N 5,64%

b) Mit Wasserstoffsuperoxyd und Pyridin.

In die violette Lösung von 1 g Dinitrothionessal-S-Dioxyd in 20 ccm alkalischer Pyridinlösung wurde bei Zimmertemperatur unter Turbinieren langsam ein Gemisch von 5 ccm Pyridin, 2 ccm 5%iger Natriummethylatlösung und 5 ccm Perhydrol eingetropft.

Die Farbe der Lösung wurde dunkelblau. Gleichzeitig erfolgte eine Abcheidung von farblosen Nadeln. Nach dem Verdünnen mit Methylalkohol wurde die farblose Substanz abfiltriert und aus Pyridin umkristallisiert. Smp.  $275^{\circ}$ . Das Produkt ist schwefelfrei.

4,827 mg Subst. 12,400 mg  $\text{CO}_2$  1,640 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>25)</sup>

5,165 mg Subst. 0,262 ccm 757 mm  $21,5^{\circ}$  <sup>23)</sup>

$\text{C}_{28}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_6$

Ber. C 70,29% H 3,77% N 5,85%

Gef. C 70,06% H 3,8 % N 5,87%

Mit Wasser wurde aus obigem Filtrat ein braunes Produkt gefällt, das sich aber nach dem Trocknen nicht umkristallisieren ließ. Es wurde deshalb versucht, das Produkt mit Kaliumpermanganat in Pyridin weiter zu oxydieren. Nach Abtrennung des Braunsteins fiel mit Wasser ein gelb-brauner Körper, der aus keinem Lösungsmittel zur Kristallisation gebracht werden konnte.

#### c) Abbau mit Ozon.

In eine heiße Lösung von 1 g  $\alpha^2$ -44'-Dinitrothioneessal-S-dioxyd in 30 ccm Aceton wurde 5 Stunden lang Ozon eingeleitet. Nach Erkalten des Lösungsmittels kristallisierte das Ausgangsprodukt wieder aus.

Der Versuch wurde mit einem höher siedenden Lösungsmittel wiederholt. 1 g Dinitroprodukt in 25 ccm Methyläthylketon wurde 5 Stunden lang in der Siedehitze ozonifiziert. Außer geringen Mengen eines gelben Harzes wurde nur Ausgangsprodukt zurückgewonnen.

Auch nach 7-stündigem Einleiten in eine Lösung von 1 g Dinitroprodukt in 30 ccm Dioxan konnte nur Ausgangsprodukt zurückerhalten werden.

Erst nach langen Einleiten in eine siedende Eisessiglösung wurde die Substanz vollständig angegriffen. 5 g Dinitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd wurden in einer Mischung von 20 ccm Eisessig und 20 ccm Essigsäureanhydrid aufgeschlemmt und im ganzen 24 Stunden Ozon eingeleitet. Zuletzt fiel nach Erkalten des Lösungsmittels kein Ausgangsmaterial (mit der charakteristischen Halochromie) mehr aus. Es wurde deshalb mit Wasser gefällt, die

ausgefallene hellgelbe Substanz filtriert und getrocknet. Ausbeute: 2,5 g. Nach mehrmaligem Umkristallisieren des größtenteils harzigen Produktes aus Benzol-Petroläther und später aus Eisessig hatten die gelben Kristalle einen Smp. von  $252^{\circ}$ . Mit Natriummethylat in Pyridin dunkelblau. Die Schwefelprobe fiel positiv aus.

4,640 mg Subst. 10,850 mg  $\text{CO}_2$  1,430 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>25)</sup>

5,59 mg Subst. 0,262 ccm 759 mm  $26^{\circ}$

Gef. C 63,77% H 3,45% N 5,36%.

Das Filtrat wurde alkalisch gemacht, von geringen Mengen alkaliumlöslicher Produkte filtriert, angeäuert und mehrmals ausgeäthert. Nach Verdampfen des Äthers und Verdünnen des in Äther gelösten Eisessigs mit etwas Wasser wurden farblose Kristalle erhalten, die nach dem Filtrieren und Trocknen 0,9 g wogen. Der Smp. lag nach dem Umkristallisieren aus Ligroin bei  $220$  bis  $225^{\circ}$  und gab mit p-Nitrobenzoesäure keine Schmelzpunktsdepression.

Die Filtrate der erhaltenen Säuren wurden bei diesen und allen folgenden Versuchen immer wieder alkalisch eingeeengt und nach dem Anäuern auf Anwesenheit anderer Nitrobenzoesäuren untersucht. Es konnten aber niemals derartige Produkte gefunden werden.

Ein weiterer Abbauversuch mit 2 g Dinitrothionessig im gleichen Lösungsmittel wie oben zeigte nach 5stündigem Einleiten von Ozon die gleichen Produkte.

#### d) Mit Chromsäure in Eisessig.

2 g Dinitrothionessig-S-dioxyd wurden in 40 ccm Eisessig mit 2 g Chromsäure eine Stunde lang am Rückflußkühler gekocht. Die Lösung wurde mit Wasser gefällt und der Rückstand abfiltriert. Das Filtrat wurde 5mal ausgeäthert, der Äther abgedampft und der darin lösliche Eisessig mit Wasser verdünnt. Die ausgefallene Säuremenge wurde mit dem oben erhaltenen Rückstand, der inzwischen mit Alkali und Säure umgefällt worden war, vereinigt. Auf diese Weise wurde 1,05 g Säure vom Smp.  $210$ — $220^{\circ}$  erhalten. Der Mischschmelzpunkt mit p-Nitrobenzoesäure lag nach dem Umkristallisieren bei  $232$ — $234^{\circ}$ .

Der in Alkali unlösliche Anteil wog 0,25 g. Die gelbe, harzige Substanz konnte nicht umkristallisiert werden.

1.  $\alpha\beta$ -44'-Diaminotetraphenylthiophen.



3 g  $\alpha\beta$ -44'-Dinitrothioneffal werden in 50 ccm Eisessig gelöst und langsam in eine Lösung von 12 g Zinnchlorür in 50 ccm Eisessig (durch Einleiten von Chlorwasserstoffgas gelöst) eingetragen. Die Farbe der reduzierten Lösung bleibt gelbstichig. Nach beendeter Reduktion läßt man erkalten, macht stark alkalisch und filtriert das zurückbleibende Amin ab. Nach dem Trocknen wird aus Benzol umkristallisiert. Smp.  $220^{\circ}$ . Dieses Diamin ist nicht so stark oxydationsempfindlich wie das vom Smp.  $273^{\circ}$ . Mit konz. Schwefelsäure schwache gelb-orange Halochromie:


25,20 mg Subst. 1,47 ccm 764 mm  $18^{\circ} 30'$

$C_{28}H_{22}N_2S$

Ber. N 6,7%

Gef. N 6,9%

2.  $\alpha\beta$ -44'-Dinitrothioneffal-S-dioxyd.



2 g  $\alpha\beta$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen werden in 40 ccm Eisessig mit 5 ccm Perhydrol auf siedendem Wasserbad 3 Stunden lang erwärmt. Die Lösung wird dann mit Wasser verdünnt, das ausgefallene Produkt filtriert und getrocknet. Ausbeute quantitativ.

Die aus Eisessig umkristallisierte Substanz schmilzt bei 194° und kristallisiert in Rosetten, die in Pyridin mit Natriummethylat eine veil-rote Halochromie zeigen.

6,43 mg Subst. 0,308 ccm 758 mm 18°.

$C_{28}H_{18}O_6N_2S$

Ber. N 5,49%

Gef. N 5,6 %

#### 4. Abbauprobuche von $\alpha\beta$ -44'-Dinitrothioneffal unter verschiedenen Oxydationsbedingungen.

##### a) Mit Chromsäure in Eisessig.

3 g Dinitroprodukt (Smp. 167°) wurden in 60 ccm Eisessig gelöst und in der Hitze mit 2,5 g Chromsäure in Eisessig versetzt. Nachdem die gesamte Chromsäure reduziert war, wurde die Lösung mit Wasser verdünnt und das ausgefallene, farblose Produkt abfiltriert. Nach mehrmaligem Umkristallisieren aus Eisessig hatte die Substanz den Smp. 220°. Die Kristalle enthielten neben Stickstoff noch Schwefel.

4,884 mg Subst. 11,740 mg  $CO_2$  1,570 mg  $H_2O$  <sup>25)</sup>

5,327 mg Subst. 0,287 ccm 748 mm 21° <sup>23)</sup>

Gef. C 65,56% H 3,6% N 6,16%

Molekulargewichtsbestimmung nach Raft.

Campher: 0,1342 g 0,1072 g

Substanz: 0,0111 g 0,0072 g

Depression: 7,7° 6,5°

Mol. Gew. 435 432

Das Ausgangsmaterial hat das Molekulargewicht 478.

Das oben erhaltene Filtrat wurde mehrmals ausgeäthert, nach Verdampfen des Äthers der darin gelöste Eisessig mit Soda abgestumpft. Nach längerem Stehen der Lösung fielen lange, farblose Nadeln aus, die nach dem Umkristallisieren aus wässrigem Alkohol den Smp. 95° zeigten. Mit Dibenzylketon und Alkali bildete sich in der Wärme Tetraphenylcyclopentadienon, das in konz. Schwefelsäure mit blauer Farbe löslich war. Außer diesen geringen Men-

gen Benzil konnten keine anderen Produkte (Säuren) nachgewiesen werden.

b) Ozonabbau.

1,1 g  $\alpha\beta$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd wurde in einer Mischung von 15 ccm Eisessig und 5 ccm Anhydrid gelöst und in der Siedehitze Ozon eingeleitet. Nach 5 Stunden wurde die noch gelbe Lösung mit Wasser gefällt und alkalisch gemacht. Dabei trat ein starker Geruch nach Benzaldehyd auf. Der alkalilunlösliche Anteil wurde abfiltriert (0,5 g nach dem Trocknen), das Filtrat angeäuert, mehrmals ausgeäthert, die ätherische Lösung getrocknet und abdestilliert. Es wurden 0,2 g Säure erhalten, die zunächst den Smp.  $212^{\circ}$  auswies. Nach dem Umkristallisieren aus Ligroin stieg der Smp. auf  $226^{\circ}$ . Der Mischschmelzpunkt mit p-Nitrobenzoesäure war bei  $233^{\circ}$ .

Es wurde ohne Erfolg versucht, das erhaltene gelbe Harz umzukristallisieren.

D 1. Hexanitrotetraphenylthiophen.

Im Gegensatz zu den schon im theoretischen Teil angeführten Versuchen von M. Fleischer<sup>3)</sup>, wurde Thionessal in kleinen Anteilen in der Kälte unter Umschütteln in rauchende Salpetersäure eingetragen. Die Temperatur stieg nicht über  $0^{\circ}$ . Nach dem Fällern mit Wasser wurde filtriert und auf Ton getrocknet. Die schwach gelbe Substanz war stark elektrisch. Der farblose Anteil löste sich in Äther, während der gelbe Rückstand mehrmals aus Pyridin mit Wasser umkristallisiert wurde. Der Schmelzpunkt blieb schließlich konstant bei  $284^{\circ}$ . Die Analyse zeigt, daß es sich um ein Hexanitroprodukt handelt.

4,699 mg Subst. 8,750 mg  $\text{CO}_2$  0,990 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>25)</sup>

8,204 mg Subst. 0,884 ccm 752,5 mm  $16^{\circ}$  <sup>23)</sup>

$\text{C}_{28}\text{H}_{14}\text{O}_{12}\text{N}_6\text{S}$

Ber. C 51,06% H 2,10% N 12,8%

Gef. C 50,79% H 2,36% N 12,7%

Es ist anzunehmen, daß es sich bei dem von Fleischer beschriebenen Tetranitrothionessal auch um eine Haxanitroprodukt handelt.

Der in Äther lösliche farblose Anteil wurde aus demselben Lösungsmittel mehrmals umkristallisiert. Smp.  $180^{\circ}$ . Bei dem Versuch, aus anderen Lösungsmitteln umzukristallisieren ging der Schmelzpunkt zurück. In Aceton lief die Substanz zu einem gelben Öl zusammen. Das Produkt enthält Stickstoff und Schwefel.

4,700 mg Subst. 9,435 mg  $\text{CO}_2$  1,440 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>5)</sup>

5,888 mg Subst. 0,354 ccm 759 mm  $14,5^{\circ}$  <sup>23)</sup>

Gef. C 54,75% H 3,43% N 7,13%

### III. Nitrierungsprodukte von $\alpha$ -4-Nitrotetratphenylthiophen.

#### 1. 22'-24'-Dinitrotetraphenylthiophen und 23-44'-Dinitrotetraphenylthiophen.

Nitriert man die Mononitroverbindung nach der Methode, die aus Thionessal Dinitrothionessal vom Smp.  $216^{\circ}$  und vom Smp.  $168^{\circ}$  liefert, so erhält man die gleichen beiden Dinitrokörper.

1 g Mononitroprodukt wird fein zerrieben, in 20 ccm Eisessig aufgeschlemmt, auf ein siedendes Wasserbad gebracht. Dazu läßt man innerhalb einer halben Stunde ein Gemisch von 2 ccm konz. Salpetersäure und 4 ccm Eisessig tropfen. Nach dem Erkalten des Lösungsmittels kristallisieren lange, gelbe Nadeln aus, die nach dem Filtrieren und Umkristallisieren aus Eisessig bei  $216^{\circ}$  schmelzen. Mit dem Dinitrokörper, der bei der Nitrierung von Thionessal mit Salpetersäure in Eisessig erhalten wird, erfolgt keine Schmelzpunktdepression.

Aus der Mutterlauge kann durch Fällen mit Wasser eine geringe Menge eines niedrig schmelzenden Dinitrokörpers erhalten werden. Die Substanz schmilzt bei  $168^{\circ}$  und zeigt gleichfalls keine Schmelzpunktdepression mit dem Dinitrothionessal vom Smp.  $168^{\circ}$ , das als Nebenprodukt bei der direkten Nitrierung von Thionessal erhalten wird.

#### IV. Nitrierung von $\alpha\alpha'$ -44'-Dinitrotetraphenylthiophen.

##### 1. Tetranitrotetraphenylthiophen.

Nitriert man Dinitrothionessal vom Smp.  $216^{\circ}$  mit rauchender Salpetersäure in Eisessig, so erhält man nach oftmaligem Umkristallisieren aus Pyridin eine in dünnen, gelben Blättchen kristallisierende Substanz vom Smp.  $302^{\circ}$ , deren Stickstoffbestimmung 4 Nitrogruppen im Molekül anzeigt.

3 g Dinitroprodukt wurden in 50 ccm Eisessig aufgeschlemmt und auf dem Wasserbad tropfenweise solange mit rauchender Salpetersäure versetzt, bis die Substanz vollständig in Lösung gegangen war. Nach dem Fällern mit Wasser wurde filtriert und die gelbe Substanz sehr oft aus Eisessig, später aus Pyridin mit Wasser umkristallisiert. Die Ausbeute an reinem Produkt vom Smp.  $302^{\circ}$  war ziemlich gering. Die Hauptmenge schmolz unter  $200^{\circ}$  und stellte wahrscheinlich ein Gemenge der verschiedensten Nitroprodukte dar.

2,892 mg Subst. 0,243 ccm 757 mm  $19^{\circ}$

$C_{28}H_{16}O_8N_4S$

Ber. N 9,85%

Gef. N 9,78%

#### V. Nitrierung von Tetraphenylthiophen-S-dioxyd.

##### 1. $\alpha$ -4-Nitrotetraphenylthiophen-S-dioxyd.

Thionessaldioxyd läßt sich nach den bisher angewandten Methoden mit Salpetersäure in Eisessig in verschiedenen Konzentrationen weder auf dem Wasserbad noch in der Siedehitze nitrieren. Erst nach Zugabe von konz. Schwefelsäure konnte ein Nitrierungsprodukt erhalten werden.

3 g Thionessal-S-Dioxyd wurden in 60 ccm Eisessig aufgeschlemmt und mit einer Mischung von 10 ccm Eisessig, 5 ccm konz. Salpetersäure und 5 ccm Salzsäure tropfenweise in der Siedehitze versetzt. Nach Zugabe der Hälfte dieser angesetzten Mischung war die gesamte Substanzmenge in Lösung gegangen. Beim Erkalten des

Lösungsmittels wurden intensiv gelbe Kristalle erhalten, die nach einmaligem Umkristallisieren den Smp.  $248^{\circ}$  aufwiesen. Der Mischschmelzpunkt mit Mononitrothionessal-S-dioxyd vom Smp.  $250^{\circ}$  zeigte keine Depression. Die Ausbeute war gering, da ein großer Teil der Substanz verharzte.

## VI. Kondensationsversuche.

### 1. Darstellung von pp'-Dinitrodibenzylsulfon.

pp'-Dinitrodibenzylsulfid <sup>31)</sup> kann mit verschiedenen Oxydationsmitteln zum Sulfon oxydiert werden. Es läßt sich mit Kaliumpermanganat und auch mit Wasserstoffsuperoxyd in gleich guter Ausbeute erhalten. Wasserstoffsuperoxyd in Sulfoessigsäure oder in Eisessig ist mehr zu empfehlen, da vom Braunstein schwierig zu reinigen ist.

3 g Dinitrodibenzylsulfid werden in 60 ccm Sulfoessigsäure aufgeschlemmt und auf dem Wasserbad mit einer Mischung von 10 ccm Anhydrid, 5 ccm Eisessig und 15 ccm Perhydrol versetzt. Die Substanz geht vorübergehend in Lösung und fällt in langen, farblosen Nadeln wieder aus. Nach dem Umkristallisieren aus Eisessig ist der Smp.  $259^{\circ}$ . Das Produkt ist löslich in Eisessig, Anhydrid und Pyridin, wenig in Alkohol und Ligroin. Mit Natriummethylat wird eine Pyridinlösung des pp'-Dinitrodibenzylsulfons violett. Die Farbe ist gegen wenig Wasser beständig. Mit viel Wasser verblaßt die Farbe und es scheiden sich rötliche Flocken ab. Eine alkoholische Suspension des Sulfons bleibt nach Zusatz wässriger Natronlauge in der Kälte farblos, erst beim Kochen tritt veil-rote, bald braun werdende Farbe auf.

24,5 mg Subst. 45,2 mg  $\text{CO}_2$  8,3 mg  $\text{H}_2\text{O}$  <sup>30)</sup>

6,20 mg Subst. 0,465 mg ccm 750 mm  $18^{\circ}$

$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_6\text{N}_2\text{S}$

Ber. C 50,00% H 3,57% N 8,33%

Gef. C 50,36% H 3,77% N 8,60%

## 2. Kondensationsversuche von pp'-Dinitrodibenzylsulfon mit Benzil.

Zu allen Versuchen wurden molekulare Mengen Benzil und pp'-Dinitrodibenzylsulfon angesetzt.

a) 2 g einer molaren Mischung von Benzil und pp'-Dinitrodibenzylsulfon wurden in 30 ccm Pyridin gelöst. Pro Mol Benzil wurden 4 Atome Natriummetall zugegeben und auf dem Wasserbad erwärmt. Am nächsten Tag wurde vom Natrium filtriert, mit Wasser zersetzt und die erhaltenen farblosen Nadeln aus Eisessig umkristallisiert. Smp. 257°. Das Produkt zeigte keine Schmelzpunktsdepression mit dem Ausgangsmaterial.

b) Sulfon und Benzil wurden in konz. Schwefelsäure gelöst. Die Lösung war zuerst gelb, dann grünlich. Mit Wasser fiel nach einigen Tagen eine farblose Substanz aus, die nach dem Trocknen und Umkristallisieren mit dem Ausgangsmaterial keine Schmelzpunktsdepression zeigte.

c) In o-Dichlorbenzol wurden molare Mengen beider Substanzen gelöst und unter Zusatz von Natriummethylat zum Sieden erhitzt. Auch hier wurde nach Aufarbeitung der Lösung nur Ausgangsmaterial zurückgewonnen.

d) Das gleiche Resultat wurde in o-Dichlorbenzol mit Phosphorpentoxyd erzielt.

e) Molare Mengen wurden ferner in Phosphoroxychlorid eingetragen und zum Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten wurde mit Wasser zersetzt, die farblose Substanz aus Eisessig umkristallisiert. Smp. 240°. Mischschmelzpunkt mit Ausgangsmaterial bei 250°.

f) Beim Zusammenschmelzen der beiden Substanzen im Salzbad erfolgte ebenfalls keine Kondensation.

g) Beim Zusammenschmelzen molarer Mengen bei Gegenwart von Zinkchlorid trat totale Verharzung ein.

## 3. Kondensationsversuche von Dibenzylsulfon mit Benzil.

Zu den folgenden Ansätzen wurden molekulare Mengen von Dibenzylsulfon und Benzil im Mörtel fein zerrieben.

a) 2 g der Mischung wurden in wasserfreiem Äther gelöst und mit Natriumamid einige Tage bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Nach dem Zersetzen mit Wasser zeigte das farblose Produkt keine Schmelzpunktdepression mit Dibenzylsulfon. (Smp. 150°.)

b) 2 g wurden in Pyridin gelöst und mit Natriummethylat versetzt. Die Lösung blieb farblos. Nach dem Fällern mit Wasser wurde das Ausgangsmaterial zurückerhalten.

c) 2 g wurden mit Phosphoroxychlorid 4 Stunden auf siedendem Wasserbad erwärmt. Danach wurde mit Wasser versetzt, filtriert und getrocknet. Es wurde auch hier nur das Ausgangsmaterial zurückgewonnen.

d) Ein weiterer Versuch wurde in konz. Schwefelsäure gemacht. Nach dreitägigem Stehenlassen bei Zimmertemperatur wurde mit Wasser verdünnt, filtriert und getrocknet. Das farblose Produkt war Ausgangsmaterial.

#### 4. Kondensationsversuche von pp'-Dinitrodibenzylsulfid mit Benzil.

Molare Mengen pp'-Dinitrodibenzylsulfid und Benzil wurden unter verschiedenen Bedingungen zu kondensieren versucht.

a) In Chlorbenzol mit Zinkchlorid durch längeres Erhitzen.

b) In der Schmelze mit Aluminiumchlorid in verschiedenen Mengenverhältnissen.

c) In Pyridin mit Natriummethylat.

Bei allen Versuchen wurde nur Ausgangsmaterial zurückerhalten. Ebenso verliefen alle Versuche mit nitriertem Benzil negativ.

#### 5. Versuche, pp'-Dinitrodibenzylsulfon zu bromieren.

Es sollte versucht werden, die Wasserstoffatome der  $\text{CH}_2$ -Gruppe zu substituieren, um dann eventuell mit Dibenzyl kondensieren zu können.

Die Bromierung wurde versucht in:

a) Nitrobenzol mit Brom und Phosphorpentabromid in der Siedehitze im Licht.

b) Eiseffig mit Brom in der Siedehitze im Licht.

c) Conz. Schwefelsäure mit Kaliumbromid.

Bei allen Versuchen wurde das Ausgangsmaterial unverändert zurückerhalten.

#### 6. Versuche, pp'-Dibromdibenzylsulfid mit Benzil zu kondensieren.

p-Brombenzylbromid <sup>34)</sup> wurde in pp'-Dibromidbenzylsulfid umgesetzt, indem die alkoholische Lösung mit Ammoniak versetzt und einige Zeit Schwefelwasserstoff eingeleitet wurde. Überschüssiger Alkohol wurde dann abdestilliert, das Sulfid mit Wasser gefällt und das erhaltene Produkt aus Alkohol umkristalliert. Smp. 58-59°.

Molare Mengen pp'-Dibromdibenzylsulfid und Benzil wurden in Alkohol gelöst und mit alkoholischer Kalilauge versetzt. Die Farbe der Lösung wurde rot-violett. Es erfolgte aber keine Kondensation.

#### 7. Kondensationsversuche von pp'-Dinitrodibenzylketon mit Benzil.

Erhitzt man molare Mengen pp'-Dinitrodibenzylketon <sup>33)</sup> mit Benzil in Alkohol mit alkoholischem Kali und dem Wasserbad am Rückflußkühler, so erfolgt vollständige Verharzung.

Bei einem anderen Versuch wurden molare Mengen in Alkohol mit Natriummethylatlösung versetzt und die Lösung bei Zimmertemperatur einen Tag stehen gelassen. Es schieden sich farblose Kristalle aus der violetten Lösung aus. Diese hatten einen Smp. von 138°. (pp'-Dinitrodibenzylketon bei 105°.) Der Stoff war in Säuren und Alkalien unlöslich. Die Ausbeute war gering. Da der niedrige Schmelzpunkt kein Kondensationsprodukt erwarten ließ, wurde von einer weiteren Untersuchung abgesehen.

#### 8. Kondensationsversuch von Thionessal mit Maleinsäureanhydrid.

Ansätze in molaren Mengenverhältnissen von Thionessal und Maleinsäureanhydrid und auch solche mit einem Überschuß an

Maleinfäureanhydrid führten in der Schmelze zu keinem Reaktionsprodukt.

Im Bombenrohr wurden 2 g Thionessal mit 1 g Maleinfäureanhydrid 3—4 Stunden auf 300° erhitzt. In der aus dem Ofen herausragenden Spitze des Einschlußrohrs hatten sich einige große Kristalle abgesetzt, die bei 290° schmolzen. Im übrigen Teil des Rohres befand sich nur zersetztes Material und Ausgangsprodukt. Die Kristalle waren in Alkohol sehr leicht löslich, in Benzol wenig. Die Substanz konnte aber nicht auf einen konstanten Schmelzpunkt gebracht werden, da derselbe zurückging. Das Produkt war schwefelfrei.

Bei einem zweiten Versuch im Einschlußrohr mit 2 g Thionessal und 2 g Maleinfäureanhydrid konnte nur Ausgangsmaterial zurückerhalten werden.

---

## Literaturangabe

- 1) Ann. 52, 354 (1844).
  - 2) Ann. 136, 94 (1865).
  - 3) Ann. 140, 239 (1866). u. Ann. 144, 192 (1867).
  - 4) Ann. 153, 352 (1870).
  - 5) Ann. 178, 370 (1875).
  - 6) Ber. 6, 390 (1873).
  - 7) Ber. 23, 3, 2472 (1890).
  - 8) Ber. 24, 3307 (1891).
  - 9) C. 1903 I 503.
  - 10) Ber. 36, 541 (1903).
  - 11) Ber. 40, 2861 (1907).
  - 12) Ber. 48, 1611 (1915).
  - 13) Ber. 49, 1918 (1916).
  - 14) C. 1918 I 908.
  - 15) W. Dilthey, W. Schommer, W. Höschen und H. Dierichs, Ber. 68, 1159 (1935).
  - 16) Ber. 24, 3307 (1891).
  - 17) Ber. 36, 541 (1903).
  - 18) Ann. 519, 297 (1935).
  - 19) J. Am. Soc. 45, 2411 (1923).
  - 20) Vgl. R. L. Shriner, H. C. Stuck u. W. J. Jorison, J. chem. soc. 52, 2060. F. Arndt, u. E. Martius, Ann. 499, 228 (1932/33).
  - 21) J. pr. Ch. (2) 85, 337 (1912).
  - 22) J. pr. Ch. (2) 101, 136 (1921).
  - 23) Analyse: cand. chem. Christeleit.
  - 24) Analyse: Frl. cand. chem. Uren.
  - 25) Analyse: Dr. Schoeller, Berlin.
  - 26) Analyse: cand. chem. Heinen.
  - 27) Analyse: Dr. C. Tiedcke.
  - 28) Analyse: cand. chem. Glafer.
  - 29) Analyse: cand. chem. Braun.
  - 30) Analyse: cand. chem. Lenz.
  - 31) J. Strakofch, Ber. 6, 1056 (1873).
  - 32) W. Wislicenus und M. Fischer, Ber. 43, 2235 (1910).
  - 33) W. Manchot und P. Krifche, Ann. 337, 176 (1904).
-

## Lebenslauf.

Am 29. Januar 1910 wurde ich, Emmi Graef, evang. Konfession, als Tochter des Kaufmanns August Graef, und seiner Ehefrau, Emmi geb. Schmedkord, in Wuppertal-Barmen geboren. Vom 6. bis zum 17. Lebensjahre besuchte ich Vorschule und Lyzeum in Unterbarmen und erhielt Ostern 1930 im Ober-Lyzeum Mittelbarmen das Reifezeugnis. Im Sommer 1930 besuchte ich eine Privathandelschule in Elberfeld und begann im Wintersemester 1930/31 in Bonn mit dem Studium der Chemie. Außer WS. 1931/32 in München, war ich nur in Bonn immatrikuliert und bestand im Winter 1933 das erste, im Winter 1935 das zweite Verbandsexamen. Seit März 1935 beschäftigte ich mich mit vorliegender Arbeit, die ich im August 1936 abschloß. Die mündliche Prüfung fand am 4. Dezember 1936 statt.

---

